

アラグリオ®内用剤1.5g 体重あたりの投与換算表

体重 (k g)	5-ALA量 (mg)	投与液量* (mL)	体重 (k g)	5-ALA量 (mg)	投与液量* (mL)
35	700	23	68	1360	45
36	720	24	69	1380	46
37	740	25	70	1400	47
38	760	25	71	1420	47
39	780	26	72	1440	48
40	800	27	73	1460	49
41	820	27	74	1480	49
42	840	28	75	1500	50
43	860	29	76	1520	51 **
44	880	29	77	1540	51 **
45	900	30	78	1560	52 **
46	920	31	79	1580	53 **
47	940	31	80	1600	53 **
48	960	32	81	1620	54 **
49	980	33	82	1640	55 **
50	1000	33	83	1660	55 **
51	1020	34	84	1680	56 **
52	1040	35	85	1700	57 **
53	1060	35	86	1720	57 **
54	1080	36	87	1740	58 **
55	1100	37	88	1760	59 **
56	1120	37	89	1780	59 **
57	1140	38	90	1800	60 **
58	1160	39	91	1820	61 **
59	1180	39	92	1840	61 **
60	1200	40	93	1860	62 **
61	1220	41	94	1880	63 **
62	1240	41	95	1900	63 **
63	1260	42	96	1920	64 **
64	1280	43	97	1940	65 **
65	1300	43	98	1960	65 **
66	1320	44	99	1980	66 **
67	1340	45	100	2000	67 **

*: 1バイアル(アミノレブリン酸塩酸塩1500mg)を水50mLにて溶解

**:*で調製した投与液を2バイアル使用